

Riegos anestésicos: niveles y causas ⁹

<i>MPS</i>	<i>Nivel de Riesgo</i>	<i>Deficiencia multisistémica</i>
I-H (Hurler) II (Hunter)	Muy alto Alto	<ul style="list-style-type: none">• Potencial obstrucción de la vía aérea superior• Dificultad para la intubación• Presencia de secreción espesa en la vía aérea• Posible insuficiencia cardíaca• Posible hipoplasia odontoidea
I-S (Scheie) I-H/S (Hurler–Scheie)	Levemente alto Alto	<ul style="list-style-type: none">• Problemas típicos de I-H (I-H/S)• Riesgo de apnea postoperatoria• Enfermedad cardíaca (especialmente insuficiencia aórtica)
III (Sanfilippo)	Generalmente no aumentado	
IV (Morquio) VII (Sly)	Muy alto	<ul style="list-style-type: none">• Hipoplasia odontoidea• Dificultad en la intubación• Posible alteración de la caja torácica• Posible insuficiencia aórtica
VI (Maroteaux-Lamy)	Alto	<ul style="list-style-type: none">• Cardiomiopatía• Cifoescoliosis severa• Trombocitopenia• Posible hipoplasia odontoidea• Despertar tardío

Adaptado de Spinello, *ISRN Anesthesiol*, 2013.